SMUR VERSAILLES

AIDE COGNITIVE

Date/Version : 12/10/2026
Rédaction CM

NORADRENALINE Ampoule de 8 mg dans 4 mL

Objectifs :

- Pouls radial non perceptible chez le blessé hémorragique en l'absence de moyen de mesure de la PA
- PAS < 80 mmHg chez le blessé hémorragique
- PAS < 120 mmHg chez le blessé neuro-agressé en l'absence de choc hémorragique

Modalités d'administration :

Dilution d'1 ampoule de 8 mg de NAD (4 mL) + 46 mL de NaCl 0,9% (8 mg dans 50 mL soit 0,16 mg/mL)
Début au PSE à vitesse 5 mL/h (0,8 mg/h) puis augmentation de 5 en 5 pour PA souhaitée
Sur VVP dédiée, du côté opposé au brassard à tension



Doses pédiatriques :
Préparation : prendre 0,5 mL (=1 mg) + 49,5 mL de NaCl 0,9%
Début PSE à *(Poids en kg/3)* mL/h (<-> 0,1 µg/kg/min)

ACIDE TRANEXAMIQUE Ampoule de 0,5 g dans 5 mL

Objectifs :

A donner au blessé hémorragique idéalement dans la 1ère heure suivant la blessure et avant la 3e heure

Modalité d'administration :

Dilution de 2 ampoules d'Acide Tranexamique soit 1 g dans 50 mL de NaCl 0,9%
Administration en IVL sur 10 minutes



Doses pédiatriques :
< 30 kg : 10 mg/kg sur 20 min puis 10 mg/kg/h IVSE
>30 kg : 1 g sur 20 min puis 1 g sur 8h